

NÖVÉNYÁPOLÁSI KÉZIKÖNYV az OBI-tól



ÖTLETTŐL
A MEGOLDÁSIG

OBI

**”ENNÉL MÁR
NEM LEHET
ZÖLDEBB!”**





Új növényei végre beköltöztek otthonába! Velük nemcsak a négy fal között lesz zöldebb, hanem az egész élete.

Az együttélés az új „növendékekkel” nem olyan nehéz, mint gondolná. Ahhoz, hogy egészségesen és erősen növekedhessenek és gyarapodhassanak, a megfelelő gondoskodásra és egy kis figyelemre van szükségük. Itt jövünk mi a képbe: megfogjuk a kezét, és megosztjuk Önnel ezt a kis, tudnivalókban bővelkedő kézikönyvet, aminek köszönhetően a növényei jól érezhetik magukat. Mivel minden növény egyedi, ezért az általános gondozási alapismereteken túl a különböző fajtákra szabott tippekkel is készültünk.

Rengeteg örömet kívánunk az új lakótárshoz!



TARTALOMJEGYZÉK

1. Alapismeretek

- 1.1 Szobanövényekkel kapcsolatos alapismeretek
- 1.2 Kaktuszokkal és pozsgásokkal kapcsolatos alapismeretek
- 1.3 Szobanövények szaporítása
- 1.4 Átültetés

2. Problémák megállapítása

- 2.1 Táblázat
- 2.2 Gyakori kártevők

3. Profilok

- 3.1 Filodendron (Philodendron)
- 3.2 Kék papagájvirág (Strelitzia nicolai)
- 3.3 Gyompálma (Chamaedorea elegans)
- 3.4 Anyósnyelv (Sansevieria)
- 3.5 Buzogányvirág (Dieffenbachia seguine)
- 3.6 Sárkányfa (Dracaena)
- 3.7 Szobai futóka (Epipremnum aureum)
- 3.8 Könnyezőpálma (Monstera)
- 3.9 Szobafikusz (Ficus elastica)
- 3.10 Lantlevelű (Ficus lyrata)
- 3.11 Pozsgafa (Crassula)
- 3.12 Legénypálma (Zamioculcas)
- 3.13 Aranypálma (Dyopsis lutescens)
- 3.14 Rákvirág (Aglaonema)
- 3.15 Vesszőkaktusz (Rhipsalis)
- 3.16 Zebralevél (Calathea)
- 3.17 Pálmaliliom (Yucca)
- 3.18 Alokázia (Alocasia)
- 3.19 Lepkeorchidea (Phalaenopsis)
- 3.20 Pénzlevelű pilea (Pilea peperomioides)



1.1 SZOBANÖVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ALAPISMERETEK

Szobanövényei egészséges és erőteljes növekedéséhez és fejlődéséhez gondoskodásra és odafigyelésre van szükségük.



A szobanövények és a páratartalom

Sok növénynek adott helyiségben kb. 60–70%-os páratartalomra van szüksége. A trópusi növények esetében 80%-nál is magasabb páratartalomra lehet szükség. Mivel a szobanövények maguk is hozzájárulnak a páratartalom növeléséhez, a több növény segít a magasabb értékek folyamatos fenntartásában. A növényeket ezenkívül szórófejes flakonból rendszeresen permetezheti vízzel, a leveleikről pedig letisztíthatja a port. Ez a gondoskodás különösen fontos télen fűtött levegő esetén, valamint forró nyarakon.

A szobanövények megfelelő öntözése

A növényeknek rendszeresen friss vízre van szükségük – de mindegyik faj sajátos igényekkel rendelkezik. Tájékozódjon az egyes növényfajokról. Ha egy növényt túllöntözik, pangó víz keletkezik, a gyökerek elrothadnak vagy a növény megfullad. Ha egy növénynek sok vízre van szüksége, a táptalaját lehetőleg mindig nedvesen kell tartani.

A mérsékelt vízigényű növényeknek akkor kell vizet adni, amikor a táptalaj az ujjunkkal megtapintva száraznak tűnik. Ha pedig egy növény alig igényel vizet, a táptalaja hosszabb ideig is száraz maradhat. Hőségben és a fűtési szezonban ne felejtse el, hogy a szobanövényeinek több vízre van szüksége. Ha ellenben a növényeket hűvös helyiségben teletteti, kevesebbet öntözze őket – a növények egyfajta téli álomba merülnek, és lényegesen kevesebb folyadékot igényelnek.

Tipp:

A növények öntözéséhez használjon állott ásványvizet. Az ásványvízben fontos ásványi anyagok, például kálium és magnézium, valamint nyomelemek, például vas található.

A szobanövények megfelelő elhelyezése

A növények ideális helyét elsősorban a fény, a páratartalom, a hőmérséklet és a helyiségen belüli tevékenység határozza meg.

Napos helyek:

Az erősebb napfényt a kaktuszok, gerberák és krizantémok, valamint a pálmafajok, például a legyezőpálma, viselik el.


Világos vagy félsárnyékos helyek:

A lakásokban a világos vagy félsárnyékos elhelyezés a legjellemzőbb. A félsárnyékos leginkább a szobanövények, például a zöldike, a szobai futóka vagy a sárkányfa kedvelik. A szobafikusz, a pálmaliliom és sok virágos növény a világosabb környezetet szereti.

Árnyékos helyek:

A páfrányok, a vanda orchideák, a vitorlavirág és az anyósnyelv kevés fénnel is beéri. Ugyanakkor magas páratartalmat igényelnek, ezért számukra ideális hely a fürdőszoba.

Ha a növényeket közvetlenül a fűtőtest fölé helyezzük, a leveleik gyorsan kiszáradhatnak. Ilyenkor több vízre van szükségük. Ez a környezet a kaktuszok számára ideális.



Megfelelő táptalaj a szobanövények számára

A megfelelő virágföld vagy táptalaj a szobanövények számára is legalább olyan fontos, mint a kerti növények számára. A táptalaj vizet és tápanyagokat raktároz, és azokat átadja a növénynek. A szobanövényekhez ajánlott virágföldek között is vannak csökkentett tőzegtartalmú és tőzegmentes termékek.

Ha szobanövényei számára ideális talajt szeretne biztosítani, használjon speciális virágföldet. Az orchideákhoz például orchideaföldet, a kaktuszokhoz pedig kaktuszföldet. A táptalaj az adott növény természetes környezetéhez igazodik, és minden megtalálható benne, amire az egészséges növekedéshez szüksége lehet.

A szobanövények megfelelően trágyázása

A szobanövények trágyázásához többféle termék áll rendelkezésre: A folyékony műtrágyát a locsolóvízbe kell adagolni. A táprudakat és a műtrágyatablettákat közvetlenül a táptalajba kell helyezni. Ezenkívül azonnali és hosszútávú hatású műtrágyák, valamint hibrid termékek is beszerezhetők. Ezekkel kapcsolatban minden esetben tartsa be gyártó utasításait. Sok hosszú hatású műtrágya akár három hónapon keresztül is fontos tápanyagokkal látja el a növényeket.



1.2 **KAKTUSZOKKAL ÉS POZSGÁSOKKAL KAPCSOLATOS ALAPISMERETEK**

A pozsgások és a kaktuszok számára mindenekelőtt egy dolog fontos: a száraz környezet. A kaktuszok eredetileg Dél-Amerikában őshonosak, a pozsgások pedig Dél-Afrika félsivatagjaiból származnak. A vízkészletek száraz időszakokra való tárolásával ideálisan alkalmazkodtak a kopár körülményekhez. Ezért különösen megfelelőek az olyan emberek számára, akik nem öntöznek rendszeresen.



A kaktuszok és a pozsgások megfelelő elhelyezése

A kaktuszok és a pozsgások tavasztól ősziig növekednek. Csak télen tartanak egy kis szünetet. Télen nem bányáznak a magasabb hőmérsékletet, de legjobban 10 °C és 15 °C között érzik magukat. Nyáron a pozsgás növényeket az erkélyre vagy a teraszra is helyezheti. Ha a hőmérséklet tartósan 15 °C alá süllyed, vigye vissza őket a lakásba vagy a házba teleltetésre. Néhány pozsgás növény azonban télálló, ezek közé tartozik a varjúháj, valamint a házi kövirózsa és a kötörőfű. Ezeket a fajtákat a kertbe vagy a zöldtetőre is kiültetheti.

A kaktuszok és a pozsgások megfelelő öntözése

A kaktuszok és a pozsgások sivatagi növényként nem kedvelik a pangó vizet, ezért a legjobb először alaposan megöntözni őket, majd tíz perc elteltével kiönteni a felesleges vizet a kaspóból vagy az alátétből. Ezután csak akkor öntözze őket újra, ha a földjük már majdnem teljesen kiszáradt. Hogy ez mennyi idő alatt következik be, az az évszaktól és a hőmérséklettől függ. Télen kevesebbet kell öntözni, mint nyáron.

A kaktuszok és a pozsgások átültetése

Az átültetésre akkor érkezett el az idő, amikor a kaktusz vagy a pozsgás növény gyökerei számára már nincs elegendő hely a cserépben – vagyis amikor a gyökerek már az egész cserépben szétterjedtek. Ideális esetben az átültetés tavasszal történik, a növények ugyanis ekkor indulnak újra növekedésnek. Létezik kifejezetten kaktuszokhoz és pozsgásokhoz való virágföld, amely biztosítja a növényeknek a megfelelő tápanyagokat, és magas homoktartalma miatt különösen vízáteresztő.

Tipp:

Az átültetés erősen igénybe veszi a növényeket. A művelet után tegye őket félárnyékos helyre nagyjából egy hétre. Csak ezután öntözze meg őket először az új edényben.

A kaktuszok és a pozsgások szaporítása

A kaktuszok és a pozsgások szaporítása rendkívül egyszerű. A legkézenfekvőbb lehetőség a bujtások használata. Egy másik, szintén egyszerű módszer a dugványok levágása. Ehhez egy éles késsel le kell vágni egy darabot a hajtásból vagy a levélből, majd hagyni kell megszáradni. Néhány nap elteltével ki kell alakulnia egy védőhártyának, vagy akár az első gyökérkezdeményeknek. Ezután a dugványt egy kis cserépbe, száraz, tápanyagban szegény szaporítóföldbe kell helyezni. Eleinte a táptalajt még ne öntözze, csak permetezze. A pozsgások esetében egy levélrózsát is leválaszthat és homokos talajba helyezhet.



1.3 SZOBANÖVÉNYEK SZAPORÍTÁSA

Szaporítás dugványokkal

Ha a dugványokat tavasszal vagy nyár elején választjuk le, azok különösen jól meggyökeresnek, mivel ekkor kezdődik el az új növekedési időszakuk. Ezenkívül ebben az időszakban a nappalok egyre hosszabbak lesznek, így a növények fejlődését a több fény is elősegíti. A tisztán vágott szél érdekében a dugványt mindig éles késsel válassza le az anyanövényről a szárcsomó alatt, ami azt a pontot jelenti, ahonnan egy vagy több levél kiindul. A fertőtlenítéshez a kést előzetesen alkoholba merítheti. A művelet során ügyeljen arra, hogy a dugványnak már 1–2 levéllel kell rendelkeznie, és hogy az alsó levél alatt 5–10 cm-rel kell levágni.

Gyökereztetés vizespohárban

A vizes poharas módszer esetén a dugvány levél nélküli részének teljes egészében víz alatt kell lennie. A vizet hetente kétszer ki kell cserélni. Egyes dugványok már néhány nap elteltével új gyökereket növesztenek, míg másoknál ugyanez a folyamat néhány hétig is eltarthat. Ha a dugvány már elegendő gyökeret hozott létre, óvatosan helyezze virágföldbe, finoman nyomogassa le, és tartsa nedvesen. A pangó vizet ugyanakkor kerülni kell. A dugvány a nem túl árnyékos helyeken, például az ablakpárkányon fejlődik a legjobban. Az év hűvösebb időszakaiban figyeljen arra, hogy a növény ne fázzon meg, amikor az ablakpárkány nagyon hideg. Ilyenkor az alátét lehet a megoldás.

A dugvány elhelyezése közvetlenül a talajban

A vizes poharas módszeren kívül a levágott hajtások közvetlenül nedves virágföldbe is helyezhetők. Ennek tápanyagban szegénynek kell lennie, hogy az erős műtrágya ne támadja meg a zseme gyökereket. Ideális esetben először szaporítóföldet kell használni, és csak később kell a növénynek megfelelő talajra váltani. Helyezze a virágcserepet világos, meleg helyre, de ne közvetlen napfényre. Borítson egy nejlonzacskót a dugványra, vagy akár az egész cserepre, hogy a víz ne párologjon el túl gyorsan. A zacskót azonban rendszeresen vegye le, nehogy penész képződjön alatta. Ha megindultak az új hajtások, a zacskó eltávolítható. Ha a fiatal növények már kellően erősek, átültethetők a számukra megfelelő táptalajba.



Szaporítás bujtással

A bujtások az anyanövény főhajtásából indulnak ki. Gyakran saját gyökereket és leveleket képeznek, ilyenkor sarjnak is nevezzük őket. Innen lehet tudni, hogy a szobanövény bujtásamár leválasztható. Ebben az esetben is nagyon éles, előzőleg alkohollal fertőtlenített kést használjon. A bujtást az anyanövényhez a lehető legközelebb vágja le úgy, hogy ne tegyen kárt abban.

Ezután helyezze a bujtást egy – ideális esetben műtrágyát nem tartalmazó – szaporítófölddel vagy táptalajjal megtöltött cserépbe, és óvatosan nyomja le. A bujtásokat a teljes növekedési időszakban csak kismértékben öntözze, hogy a gyökereik ne kezdjenek el rothadni. Mindenképpen kerülni kell a pangó vizet. Ezért csak akkor öntözze, ha a szobanövénynek vízre van szüksége. A palánta a normál, 20 °C körüli szobahőmérsékletet kedveli a legjobban, és nem szereti a közvetlen napfényt. Később tegye át a szobanövényt az igényeinek megfelelő helyre.

Szaporítás légbujtással

A légbujtás egy másik növénysszaporítási módszer. Különösen jól működik bonszájok és pálmák esetében. A légbujtás készítésekor egy éles késsel átlósan be kell vágni a hajtást, és erre a helyre egy éket kell képezni. Az ék segítségével tartsa egyenletesen nedvesen a területet. Ehhez tekerjen köré egy átlátszó műanyag fóliát, ezáltal meleg, párás klímát biztosítva. Gyökereztető porral gyorsabb gyökérvégződés érhető el. A légbujtás egy olyan szaporítási mód, amelyet érdemes tavasszal elvégezni, mert a növény ekkor a legerősebb.



1.4 ÁTÜLTETÉS

Mikor kell elvégezni?

A növénytartó egy idő után kicsi lesz a növény számára, vagy a talaj előregszik és elhasználódik – a szobanövényeket időről időre át kell ültetni. A szobanövények gyökereinek egy új cserépben több tere lesz a kibontakozáshoz, illetve az új talaj jobban ellátja a szobanövényt tápanyagokkal, így a növény tovább növekszik és fejlődik.

Időpont:

A legtöbb növény számára az ideális átültetési időszak a tavasz, amikor új levelek hajtanak ki, és megjelennek az első hajtások.

Gyakoriság:

Az átültetés gyakorisága a növekedés mértékétől függ: A kisebb növényeket kb. 2–3 évente, a nagyobbakat 4–5 évente kell átültetni.

A virágcserep és a kaspó kiválasztása

A szobanövényhez megfelelő edény kiválasztásakor először is különbséget kell tenni a virágcserep és a kaspó között. A virágcserepbe közvetlenül ültetjük be a növényeket. A kaspó anyagától függően csökkenti a pangó víz kockázatát és díszíti a lakást.

Virágcserepeket öntöző funkcióval és anélkül is vásárolhat. Az öntöző virágcserepek biztosítják a növények egyenletes vízellátását, és ezáltal megkönnyítik azok gondozását. Az öntözés gyakoriságát az agyag- és a műanyagcserepek közötti választás is befolyásolja, mivel az agyag magába tudja szívni a vizet.

Megjegyzés:


Ügyeljen arra, hogy a virágcserep és a kaspó között legyen némi távolság. Ez teszi lehetővé a felesleges víz elfolyását, megakadályozva a pangó víz felhalmozódását.

Mire kell odafigyelni átültetéskor?

A régi virágföldet óvatosan és alaposan távolítsa el. A növény finom rázása elősegítheti a táptalaj fellazítását. Másik – vagy akár kiegészítő – megoldásként a növényeket az újbóli beültetés előtt vízfürdőbe is helyezheti, ami segít a megkötött föld fellazításában és alaposan megnedvesíti a gyökérrendszert. A művelet során azonban ügyeljen a növény igényeire, nem minden növény viseli el a vízfürdőt.

Beültetés előtt válassza ki, hogy az új növénytartóban milyen táptalajt kap a növény, és mekkora legyen az új cserép vagy dézsa. Az univerzális virágföldön kívül számos növényhez speciális virágföld is kapható, amely mindent tartalmaz, amire az adott növényfajnak szüksége van. Az új növénytartó ne legyen se túl kicsi, se túl nagy. Egyfelől a növénynek jól kell tudnia fejlődni és növekedni, másfelől talán érdemes korlátozni is a növekedést, nehogy túlságosan nagy legyen a növény kiterjedése.

A megfelelő virágföld mellett biztosítson egy vízelvezető réteget is. Ez védi a növényt a pangó víztől, és segít raktározni a felesleges nedvességet, amely szükség esetén visszaadagolható a táptalajba. Az agyagdarabok és a speciális granulátumok kiválóan alkalmasak erre a célra.



2.1 PROBLÉMÁK MEGÁLLAPÍTÁSA

Néhány fontos jel alapján gyorsan kiderítheti, mi hiányzik szobanövényeinek. Általában a növény levelei a legbeszédesebbek, hogy miben szenved hiányt a növény. Sok esetben segít a növény áthelyezése vagy a kevesebb víz.

Időben reagáljon a következő figyelmeztető jelekre:

Tünet	Probléma	Intézkedés
Sárga levélvégek vagy lehulló levelek	Túlságosan hűvös környezet	Áthelyezés
Barna foltok a leveleken vagy sárga, lehulló levelek	Túl sok víz, pangó víz	Kevesebb locsolás, növény szárazon tartása
A fiatal levelek nem bontakoznak ki, elsatnyulnak és lehullanak	Atka	Kevesebb locsolás, növény szárazon tartása
Barna vagy fekete foltok a levélvégeken, ernyedő levelek	Túl száraz levegő	Áthelyezés, magasabb páratartalom
A növény gyorsan sok levelet veszít	Pangó víz	Kevesebb locsolás, növény szárazon tartása
Gyenge növekedés, fakó, sárgás levelek	Fényhiány	Áthelyezés
Virágbimbók elvesztése	Erős huzat	Áthelyezés
Hiányos, lyukas levelek	Kártevők általi fertőzés	Kártevőirtás



2.2 GYAKORI KÁRTEVŐK

A kedvezőtlen életkörülmények – például a magas hőmérséklet, a szárazság és télen a fűtött levegő – érzékennyé teszik a szobanövényeket az olyan kártevőkre, mint a takácsatka, a pajzstetű, a tripsz vagy a viaszos pajzstetű. Ha a kártevők ellen nem lépünk fel, szívó tevékenységükkel károsítják a növényeket, és adott esetben a lakásban található

többi növényre is áttérjedhetnek.

Ezért rendszeresen ellenőrizze a növényeit kártevők szempontjából, különösen a levelek alsó oldalán. Ha kártevőt észlel, haladéktalanul távolítsa azt el, és győződjön meg arról, hogy nem terjedt át más szobanövényekre.

Egyszerű kártevőirtási tippek

- Takácsatka: Csomagolja be a növényt tíz napra légmentesen egy nejlonzacskóba
- Levéltetű: Áztassa a leveleket vízfürdőben két órán keresztül
- Pajzstetű: távolítsa el nedves ronggyal vagy alkohollal átitatott fültisztító pálcikával
- Tripsz (rojtosszárnyú): alaposan zuhanyozza le a növényt több egymást követő napon

A háztartási szereken kívül hatékony növényvédő szerek is rendelkezésre állnak. Ezek a termékek különösen makacs fertőzés esetén jelenthetnek gyors segítséget. A növényvédő szereket mindig óvatosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt, vagy kérjen tanácsot az OBI áruházban.



3. **PROFILOK**



3.1 FILODENDRON

Philodendron

A filodendron Dél-Amerika és a Karib-térség trópusi esőerdőiben őshonos – itt a növény a légyökerei segítségével mászik fel a magas fákra, innen kapta az elnevezését is (philodendron = fát kedvelő). A mintegy 280 faj nemcsak a lombzat méretében, hanem a levelek színében is eltér egymástól: A zöld példányok mellett egyes fajok lilás árnyalatukkal és szokatlan levélrajzolatukkal is felhívják magukra a figyelmet. A növekedési módban is vannak különbségek - egyes fajok függőlegesen nőnek, míg mások függenek vagy kúsznak.





ELHELYEZÉS

- Közvetlen napfénytől védett, félárnyékos vagy világos hely
- Ideális esetben keleti vagy nyugati tájolású, huzattól védett hely
- Sötét helyeken is fejlődik, de ott a levelek elveszítik intenzív színüket, és a növekedési forma is csorbát szenved
- Egész évben a 18–22 °C közötti hőmérsékletet és a magas páratartalmat kedveli
- Tápanyagban gazdag, laza föld, jó vízáteresztő képességű talaj



ÖNTÖZÉS

- Egyenletes talajnedvesség, pangó víz nélkül
- 15 perccel öntözés után öntse le az alátétben maradt vizet
- Locsolni 3–5 naponta elegendő
- A kisebb növényeket hetente egyszer merítse vízbe (áztassa őket vízben néhány percig a cserép felső széléig, amíg már nem úsznak fel légbuborékok, majd hagyja lecsepegni)
- Naponta permetezze meg alacsony mésztartalmú vízzel



GONDOZÁS

- Fajtától függően helyezzen el egy kókuszkarót kúszási segédeszközként, esetleg gyengén kösse rá a hajtásokat
- Ne vágja le a légyökereket, mert felszívják a levegőben lévő tápanyagokat és nedvességet
- A kisméretű növényeket havonta egyszer zuhanyozza le gyenge vízsugárral, a nagyobbakat pedig portalanítsa nedves törülközővel
- A túl nagyra nőtt növényeket tavasszal metssze meg
- Márciustól októberig hetente, télen pedig havonta egyszer végezzen trágyázást szobanövényekhez való műtrágyával
- 1–2 évente tavasszal ültesse át a növényeket 5–8 cm-rel nagyobb cserépbe szobanövényekhez való, jó minőségű virágföld felhasználásával, agyaggranulátumból vízelvezető réteget képezve



SZAPORÍTÁS

- Szaporítás dugványokkal: tavasszal vágja le a hajtásvégeket, és helyezze őket szaporítóföldbe; a meggyökerezésig tegyen műanyagzacskót a cserépre, így biztosíthatja a magas páratartalmat
- Másik lehetőségként a dugványt vizespohárba is helyezheti; ezután várjon 6–8 hétig, hogy erős gyökerek képződjenek, majd ültesse szaporítóföldbe

3.2 KÉK PAPAGÁJVIRÁG

Strelitzia nicolai

A Strelitzia nemzetség többi fajához hasonlóan a kék papagájvirág is Dél-Afrikából származik, ugyanakkor nemcsak ott, hanem a Kanári-szigeteken, Madeirán és az Azori-szigeteken is előfordul. A kék papagájvirág szokatlan formájú virágokat hoz, amelyek színpompás madárfejekre emlékeztetnek. Ezért a vele szoros rokonságban álló *Strelitzia reginae* fajt „paradicsom-madár-virágnak” is nevezik. A banánfa leveleire emlékeztető mélyzöld leveleivel a kék papagájvirág eredeti otthonában akár tíz méter magasra is megnőhet, itthon azonban napos helyen, dézsában is csak jóval kisebb termetet ér el.





ELHELYEZÉS

- Napos vagy teljesen napsütöttes hely (pl. télikert)
- Májustól napos, szélvédett helyre kihelyezhető
- A hőmérséklet télen sem csökkenhet 10 °C alá
- Kedveli az agyagos-homokos, tápanyagban gazdag, dézsás növényekhez való virágföldet
- Ajánlott agyaggranulátumból, kőzúzalékból vagy finom kavicsból vízelvezető réteget kialakítani



ÖNTÖZÉS

- Tartsa a talajt mérsékelten nedvesen
- Különösen a meleg napokon öntözze rendszeresen
- Télen ritkábban is elég öntözni
- Lehetőség szerint kerülje a pangó vizet
- Öntözés után mintegy 20 perccel öntse ki a felesleges vizet az alátétből



GONDOZÁS

- Április és október között havonta egyszer használjon folyékony műtrágyát
- Metszeni nem szükséges
- Távolítsa el a régi leveleket, hogy a fiatalabbaknak elegendő levegő és fény jusson
- Háromévente cserélje ki a dézsa talaját, ügyelve arra, hogy ne károsítsa a nagy gyökereket
- Az első virágzástól kezdve kerülje az áthelyezést



SZAPORÍTÁS

- Szaporítás az oldalhajtások osztásával vagy leválasztásával
- Ideális esetben április és május között
- Legyen óvatos, hogy ne tegyen nagyobb kárt a növényben
- A fiatal növények számára válasszon félig napos helyet

3.3 GYOMPÁLMA

Chamaedorea elegans

A gyompálma Közép-Amerika hegyvidéki régióiban honos, Mexikótól Guatemaláig. Jellemző rá a karcsú törzs a szemben elhelyezkedő levélcsomókkal, amelyek zöld, szárnyas pálmalevelekből állnak. Természetes elterjedési területén a gyompálma akár 3 m magas és 2 m széles is lehet – szobanövényként azonban nálunk ritkán ér el ilyen méreteket.





ELHELYEZÉS

- Világos vagy félárnyékos, de közvetlen napfénytől védett
- Mérsékelt meleg hely, nagyjából 20 °C
- A téli hónapokban tárolja hűvös helyen, 12 °C és 15 °C között
- Jó vízáteresztő képességű, enyhén lúgos táptalaj, pálmaföld vagy gyógynövényföld, esetleg azonos mennyiségű virágföld és homok keveréke



ÖNTÖZÉS

- Ügyeljen arra, hogy a talaj ne száradjon ki
- Öntözze rendszeresen, különösen nyáron
- A cserépet nyáron hetente egyszer áztassa vízben néhány percig az edény felső széléig, amíg már nem úsznak fel légbuborékok, majd hagyja lecsepegni
- Kerülje a pangó vizet
- Télen tartsa enyhén nedvesen a táptalajt



GONDOZÁS

- Ha a helyiség levegője száraz, permetezze be rendszeresen mészhmentes vízzel
- Második életévétől kezdve március és szeptember között 2–3 hetente trágyázza meg kis mennyiségű, szobanövényekhez vagy pálmákhoz való műtrágyával
- Tavasszal ültesse át, ha a cseret már teljesen benőtte a gyökér
- A fiatal növényeket két évente, az idősebbeket öt évente kell átültetni
- Az elszáradt leveleket éles metszőollóval vágja le a törzsről
- Vágja le a vékony levélvégeket háztartási ollóval



SZAPORÍTÁS

- Szaporítás magvakkal vagy csemetékkel
- A termés kifejlődéséhez porzós és termős növény is szükséges; a termős virágokat naponta többször ecsettel kell beporozni
- A gyompálma faj csemetékkel szaporítható – ezeket késsel válassza le, ültesse őket szaporítóföldbe, majd takarja le őket fóliával, amíg ki nem hajtanak

3.4 **ANYÓSNYELV**

Sansevieria

Az anyósnyelv a spárgafélék családjába tartozik és a sárkányfával áll rokonságban. Az anyósnyelvnek 67 faja ismert, ezek többsége Afrikában él. A kenderszerű rostok miatt az anyósnyelv haszonnövényként is szolgál – rostjait ma is használják kötelek és íjhúrok készítéséhez.





ELHELYEZÉS

- Világos hely egy nagy ablak mellett, 21 °C és 24 °C közötti hőmérséklet
- A hőmérséklet ne csökkenjen 10 °C alá
- A téli hónapokban állítsa világosabb helyre, és ne tegye ki huzatnak
- Optimális hálósobai növény – éjszaka oxigén termelésével járul hozzá az optimális alvási körülmények megteremtéséhez
- Vízáteresztő és ásványi anyagokban gazdag táptalaj, ideális esetben agyaggranulátumból vagy durva homokból és szobanövényekhez való virágföldből álló keverék egyenlő arányban, esetleg pozsgás- vagy kaktuszföld



ÖNTÖZÉS

- Jó vízelvezetést biztosító cserép a pangó víz elkerülése érdekében
- A növényt csak akkor kell megöntözni, ha a virágföldje már teljesen kiszáradt
- Az alacsony mésztartalmú, állott csapvizet kedveli
- Ne öntsön vizet közvetlenül a levélrózsákba
- Télen kevesebbet locsolja



GONDOZÁS

- Március és október között három-négy hetente adagoljon kaktuszhoz vagy szobanövényekhez való folyékony műtrágyát az öntözővízhez
- Ha a növény kitolja magát a cserépből, ültesse át márciusban vagy áprilisban
- Ha egy-egy levél oldalra kihajlik, ültesse át nagyobb edénybe
- Metszeni nem szükséges



SZAPORÍTÁS

- A zöld anyósnyelv dugványokkal szaporítható
- A fiatalabb növények mintegy 5 cm hosszú leveleit hagyja a levegőn száradni egy hétig
- Helyezze a levéldarabokat a vágott szélükkel lefelé nedves táptalajba, és tegye őket félárnyékos helyre kb. 21 °C-on
- Ha a dugványokon meggyökerezett gyöktörzsek és új levelek alakulnak ki, ültesse be őket külön-külön
- A sárga csíkos fajtákat szétválasztással szaporítsa
- Átültetéskor válasszon le az anyanövényről meggyökerezett gyöktörzseket néhány levéllel, a hosszú levelű fajtáknál a leveleket rövidítse le körülbelül a felére, és ültesse be őket
- A rozettaszerűen növekvő fajtáknál az egyes gyökeres rozettákat óvatosan válassza el egymástól, és helyezze az egyes részeket cserepekbe

3.5 **BUZOGÁNYVIRÁG**

Dieffenbachia seguine

A buzogányvirág Közép- és Dél-Amerika trópusi esőerdőiben honos. A kontyvirágfélék (Araceae) családjába tartozik. Ettől nemcsak szép, hanem minden részében mérgező is. A buzogányvirág talán legszembevetőbb jellemzője a mintás levél. Levelei akár 45 cm hosszúak is lehetnek, tojás vagy ellipszis alakúak, de a végük mindig hegyes.





ELHELYEZÉS

- A magas, 21 °C és 30 °C közötti szobahőmérsékletet és a magas páratartalmat kedveli
- A legjobb hely számára egy világos, huzatmentes fürdőszoba, emelt pozícióban
- Minél intenzívebb a levelek mintázata, annál több fényt visel el a növény
- A leveleket ne érje közvetlen napfény
- Télen elegendő a 15 °C és 18 °C közötti hőmérséklet
- Tápanyagban és humuszban gazdag talaj, amelyet faszéndarabokkal vagy agyaggranulátum darabokkal lehet vízáteresztőbbé tenni



ÖNTÖZÉS

- Jó vízelvezetést biztosító cserép a pangó víz elkerülése érdekében
- Tartsa mindig enyhén nedvesen a földjét
- Nagy vízigénye miatt rendszeresen öntözze
- Csak akkor adjon neki vizet, ha a virágföld felszíne kissé már megszáradt
- Ha túllocsolta, vegye ki a növényt az edényből, és csomagolja újságpapírba, amely a földlabdából felszívja a felesleges vizet



GONDOZÁS

- A magas páratartalom érdekében helyezze a cserepet egy agyaggranulátummal és vízzel feltöltött nagyméretű alátétre
- Ideális esetben rendszeresen permetezze desztillált vízzel
- A növekedési szakaszban őszig 14 naponta, télen négyhetente trágyázza
- A fiatalabb növényeket kétevente, az idősebb példányokat ötévente ültesse át
- Az átültetés mindig tavasszal történjen, és a növénytartó méretét csak kismértékben növelje
- Érdemes súlyos cserepet választani, mert az idősebb példányok hajlamosak felborulni
- Átültetéskor viseljen kesztyűt
- Nincs szükség rendszeres metszésre
- A fonnyadt leveleket távolítsa el



SZAPORÍTÁS

- Szaporítás fejdugványokkal, amelyeket egy vízzel töltött edénybe kell helyezni, amíg ki nem alakulnak a gyökerek
- A másik lehetőség a törzsdugványok levágása – vágjon le egy 5 cm hosszú darabot a törzsből, helyezze vízszintesen szaporítótalajra, és a magasabb páratartalom érdekében tegyen rá valamilyen borítást
- Átültetéskor a gyöktörzs is felosztható, a gyökereknek legalább egy törzzsel vagy hajtással kell rendelkezniük

3.6 SÁRKÁNYFA

Dracaena

A sárkányfa az agávefélék családjába tartozik. Ezek eredetileg a trópusokról és a szubtrópusokról származnak – de ma már a Kanári-szigeteken, sőt, akár az Ön otthonában is megteremnek! Hiszen a sárkányfa népszerű irodai és szobanövény. A sárkányfa valójában nem igazán fa, mert csak a pálmászerű törzse van elfásulva. Levelei hosszúak és hegyesek. A színük zöld, foltos és csíkos lehet. Szobanövényként a sárkányfa akár 2 m magasra is megnő. Ha a sárkányfa egy kicsit már korosabb, nyáron fehéres-vöröses, zöldesfehér vagy krémfehér virágok nőnek rajta.





ELHELYEZÉS

- Világos, meleg és párás hely
- Kerülje a közvetlen napfényt
- Télen legyen legalább 15 °C a helyiségben
- Ne legyen hideg a talaj és ne legyen huzat
- Az enyhén savas, 6-os pH-értékű táptalajt kedveli
- Használjon szobanövényekhez vagy pálmákhoz való virágföldet



ÖNTÖZÉS

- Jó vízelvezetést biztosító cserép a pangó víz elkerülése érdekében
- Egész évben tartsa egyenletesen nedvesen
- Ha a levélvégek barnásan elszíneződének, a táptalaj nem elég nedves
- Mindig öntözze meg, ha a talaj felső rétege kiszáradt; télen ritkábban öntözze
- Használjon esővizet vagy alacsony mésztartalmú, szobahőmérsékletű vizet



GONDOZÁS

- Márciustól szeptemberig kéthetente trágyázza meg szobanövényekhez való folyékony műtrágyával
- Októbertől februárig hathetente adagoljon műtrágyát az öntözővízhez
- A fiatal sárkányfákat minden tavasszal ültesse át egy 3 cm-rel nagyobb cserépbe
- Ha a növényt túl sötét helyen tartjuk, nem fejlődnek ki a levélhajtások; ilyenkor éles metszőollóval készítsen bevágást, így ösztönözve a hajtások kialakulását
- Jól bírja a metszést, ideálisan tavasszal kell metszeni
- A levágott részek szaporításra használhatók



SZAPORÍTÁS

- Szaporítás fej- vagy törzsdugványokkal, amelyeket egy vízzel telt edénybe kell helyezni, amíg ki nem alakulnak a gyökerek
- A meggyökeresedett dugványokat aztán ültesse egy szaporítóedénybe



3.7 ARANYOS SZOBAFUTÓKA

Epipremnum aureum

Az aranyos szobafutóka a kontyvirágfélék családjába tartozik és Délkelet-Ázsiában, Ausztráliában, valamint a Csendes-óceáni szigeteken őshonos. Az aranyos szobafutóka örökzöld, évelő és lágyszárú. Akár 10 m hosszú hajtásaival a kúszónövények közé tartozik. Így függő virágtartóban csüngő növényként is nevelhető, de kókuszkaróval ellátott cserépbe is helyezhető, amelyben lehetősége van felkúszni a rúdra. Az aranyos szobafutóka levelei nagyon különböző árnyalatokat vehetnek fel. A leveleken fajtától függően fehér, krémszínű vagy sárga foltok vagy mintázatok fordulhatnak elő.





ELHELYEZÉS

- Nem télálló
- A szobahőmérséklet legalább 20 °C, télen pedig legalább 16 °C legyen
- A közvetlen napfénytől és huzattól védett, világos vagy félárnyékos helyeket kedveli
- Minél sötétebb a lombzat, annál sötétebb lehet a helye
- A tarka levelű fajtáknak több fényre van szükségük
- Kiválóan megfelel nagyobb magasságban, például függő virágtartóban, szekrényen vagy polcon történő elhelyezésre
- Ideális fürdőszobai növény a magas páratartalom miatt
- Használjon kereskedelmi forgalomban kapható virágföldet vagy a hidrokultúrához megfelelő táptalajt (pl. agyaggranulátum)



ÖNTÖZÉS

- Rendszeres öntözés, hogy a táptalaj mindig egy kicsit nedves legyen
- A pangó víz elkerülése érdekében a felesleges vizet közvetlenül öntse le
- Az időnkénti szárazság nem jelent problémát
- Télen kevesebbet locsolja



GONDOZÁS

- Opcionális műtrágyázás hetente vagy 14 naponta a növekedési szakaszban március és augusztus között levéldísznövényekhez való műtrágyával
- Kétévente ültesse át; teljesen cserélje ki a földet, és vágja vissza a gyökérvégeket
- Rövidítse le a hosszú hajtásokat, hogy a növény jobban elágazhasson



SZAPORÍTÁS

- Szaporítás fej- és hajtásdugványokkal, vizespohárban
- Amint kb. 2 cm-es gyökerek alakulnak ki a csomóponton, ültessen több fiatal növényt egyetlen cserépbe
- Alternatív szaporítási mód bujtóvesszővel
- A léggyökereket eresztett hajtásvégeket bujtásként eressze be egy agyaggranulátummal vagy virágfölddel töltött cserépbe anélkül, hogy leválasztaná őket az anyanövényről
- Amint új levelek jelennek meg a bujtóvesszőn, válassza azt le

3.8 KÖNNYEZŐPÁLMA

Monstera

A könnyezőpálma eredetileg Közép- és Dél-Amerika trópusi esőerdőiből származik, és a kontyvirágfélék családjába tartozik. A nemzetségében mintegy 20–50 faj található, idehaza ezek közül a *Monstera deliciosa* a legkedveltebb. Őshazájában a könnyezőpálma a fatörzsek köré tekeredik, és a magas fák tetejéig felkapaszkodik. Szobanövényként bútordarabokat, ablakkereteket vagy akár más növények ágait keresi, hogy köréjük fonódjon. A *Monstera* levélformája összetéveszthetetlen, és méltán népszerű divat- és dekorációs motívumként.





ELHELYEZÉS

- Sok helyet igényel
- A világos, meleg, párás helyeket és a tápanyagban gazdag táptalajt kedveli
- Különösen jól fejlődik, ha több oldalról is éri fény
- Nyáron akár kültéren is állhat félárnyékos helyen



ÖNTÖZÉS

- Rendszeresen kell öntözni
- Kerülje a pangó vizet
- Ha átmenetileg nem lehet öntözni, helyezze a légygökereit vizespoharakba



GONDOZÁS

- Időnként permetezze be szobahőmérsékletű vagy desztillált vízzel
- Április és augusztus között trágyázza meg szobanövényekhez való folyékony műtrágyával, de a megadott dózist felezze meg
- A fiatalabb könnyezőpálmákat évente ültesse át
- Idősebb példányok esetén tavasszal cserélje ki a virágföld felső 3 cm-ét friss táptalajra
- Porosodás esetén törölje le a leveleket nedves ruhával
- A húsos szárazakat ollóval bármikor tetszőlegesen lerövidítheti
- A légygökereket ne vágja le, hanem vezesse be a virágföldbe



SZAPORÍTÁS

- Nyáron bujtással szaporítható
- A fej- és törzsdugványok egy 25 °C-os vizes edényben megbízhatóan gyökereznek
- A dugványokat úgy vágja le, hogy a lehető legtöbb légygöke legyen
- Légbujtásra is lehetőség van; ehhez vágjon le egy légygökeret, és helyezze azt frissentartó fóliába moha-talaj keverékkel, amíg ki nem alakulnak a gyökerek



3.9 SZOBAFIKUSZ

Ficus elastica

A nagy, sötétzöld levelű szobafikusz az örökzöld szobanövények klasszikusa, és nagy népszerűségnek örvend. Eredetileg Kelet-Indiából és Indonéziából származik. A szobafikusz egy fűgefaj. Szobanövényként ugyanakkor nem hoz termést, mert nincs beporozva. A cserép méretétől és elhelyezésétől függően a szobafikusz 1 m és 2 m közötti magasságot ér el. Fényes, bőrszerű felületű, nagy ovális levelei szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak.





ELHELYEZÉS

- A világos és félárnyékos helyeket kedveli
- A hőmérsékletnek legalább 18 °C-nak kell lennie
- Feltétlenül kerülni kell a huzatot
- Helyezze szobanövényekhez való normál virágföldbe
- A homokos talaj is megfelelő



ÖNTÖZÉS

- Mérsékeltan öntözze, ha a virágföld felszíne már száraz
- Másik megoldásként a növényt vízfürdőbe is helyezheti



GONDOZÁS

- Tavasztól nyárig trágyázza meg szobanövényekhez való folyékony műtrágyával
- A fiatal növényt két évente tavasszal ültesse át; az idősebb példányokat csak 4-5 évente
- A leveleket rendszeresen porolja le: a kisebb példányokat zuhany alatt, a nagyobbakat nedves ruhával
- A zuhanyozás után puha ruhával törölje le a növényt a vízkőfoltok elkerülése érdekében
- A fényesebb külső érdekében törölje át a leveleket sörbe kissé megmártott ruhával
- A jobb elágazódás érdekében vágja be egy levél középső hajtását, hogy új oldalhajtás alakuljon ki
- Vigyázat: a vágás során tegyen újságpapírt a fa alá, mert a kifolyó nedv rendkívül ragadós



SZAPORÍTÁS

- Szaporítás dugványokkal
- Éles késsel vágjon le dugványokat az oldalhajtásról
- Vágja le az összes levelet a legfelső kivételével, vágja vissza a dugványt 6–8 cm-esre
- Tegye a dugványt egy vízzel telt pohárba
- Kétnaponta cserélje ki a vizet



3.10 **LANTLEVELŰ FIKUSZ**

Ficus lyrata

Impozáns méret és egyedi levéldísz: Nem csoda, hogy a lantlevelű fikusz egyre több otthonban megtalálható. Az akár négy méter magasra is megnövő kis fa a fügék (Ficus) nemzetségébe tartozik, és a nyugat-afrikai trópusokon honos. Ez azt jelenti, hogy lantlevelű fikusznak térre van szüksége a teljes kibontakozáshoz!





ELHELYEZÉS

- A közvetlen napfénytől és huzattól védett, világos helyeket kedveli
- Elegendő hely a levelek kibontakozásához és a növekedéshez
- A normál szobahőmérsékletet vagy az annál magasabb hőmérsékletet kedveli, télen se legyen 18 °C-nál hidegebb
- Kerülje az áthelyezést és a növény elforgatását
- Megfelelő táptalaj: szobanövényekhez való virágföld, esetleg homokkal keverve, hogy a gyökereket védeni lehessen a pangó víztől
- Másik lehetőség a hidrokultúrához megfelelő táptalaj (pl. agyaggranulátum)



ÖNTÖZÉS

- Ha a virágföld legfelső rétege kissé már megszáradt, de az alatta lévő föld még nedves, öntözze meg a növényt
- Télen kevesebbet öntözze, de mindig ügyeljen arra, hogy a táptalaj ne száradjon ki teljesen



GONDOZÁS

- Rendszeresen távolítsa el a levelekről a port
- Opcionális trágyázás szobanövényekhez való folyékony műtrágyával március és október között hetente egyszer, télen hathetente
- Másik lehetőség: Hosszú hatástartamú műtrágya, például táprudak formájában
- A fiatal növényeket évente egyszer, az idősebbeket pedig 2–3 évente ültesse át tavasszal vagy nyáron, hogy ezzel elősegítse növekedésüket
- Metszésre nincs szükség, az elszáradt levelek egyszerűen eltávolíthatók



SZAPORÍTÁS

- Szaporítás fej- vagy levéldugványokkal
- Fejdugványok: tavasszal válassza le a lágy, még nem elfásult hajtásokat, és a gyökérképződés érdekében helyezze őket meleg vízbe, vagy ültesse őket közvetlenül táptalajba
- Levéldugványok: válassza le és tegye vízbe a leveleket, amíg gyökeret nem eresztenek, majd ültesse el őket

3.11 POZSGAFA

Crassula

A pénzfa pozsgás növény, a varjúhájfélék (Crassulaceae) családjába tartozik. Nevét érmeszerű leveleiről kapta, amik nemcsak szemre tetszetősek, hanem állítólag pénzt és szerencsét is hoznak. Őshazája Dél-Afrikában van. A pénzfát vagy pozsgafát sokan mini növényként vásárolják meg, megfelelő gondozás mellett azonban a néhány centiméteres növény az évek során kisebb fává növekszik. Végleges magassága átlagosan 50 cm és 100 cm között van, egyes példányok azonban ennél is nagyobbak.





ELHELYEZÉS

- Nyáron: Árnyékos vagy félarányékos (erkély, terasz, ablak)
- Télen: hűvös (10 °C körül) és világos (ablak)
- Télen kerülje a fűtött levegőt
- Laza, tápanyagban szegény talaj, negyed részben homokkal keverve
- Másik megoldásként kaktuszföld is használható, fele arányban ásványi anyagokat tartalmazó táptalajjal keverve



ÖNTÖZÉS

- Öntözze rendszeresen, de kerülje a pangó vizet
- Forró napokon nagy mennyiségű vizet is elvisel
- Különösen a növekedési szakaszban öntözze
- Télen több napig is kibírja víz nélkül



GONDOZÁS

- Áprilistól szeptemberig havonta egyszer trágyázza meg kaktuszokhoz vagy pozsgásokhoz való műtrágyával
- Eleinte két-három évente, később ötévente tavasszal vagy nyáron ültesse át
- Évente egyszer-kétszer vágja le az ágakat ollóval a finom barázdáknál, ügyelve arra, hogy ne hagyjon meg hajtásmaradványokat



SZAPORÍTÁS

- A fej- és levéldugványokat tavasszal kell levágni
- Vágja le a friss hajtásokat az ág végéről, és tegye őket egy pohár vízbe a gyökerek kialakulásáig, majd ültesse el őket egy új edénybe
- Levéldugványokat is készíthet, ezeknél azonban hosszabb ideig tart a gyökerek kifejlődése

3.12 **LEGÉNYPÁLMA**

Zamioculcas

A legénypálma, valójában *Zamioculcas zamiifolia*, szerencsehozóként is ismert. A legénypálma ideális választás azoknak, akik nincsenek túl sok kertészeti érzékkel megáldva, mivel rendkívül egyszerű a gondozása. A dekoratív és elpusztíthatatlan legénypálma ajándékként vagy irodai növényként is rendkívül népszerű. Botanikailag a kontyvirágfélék (*Araceae*) családjába tartozik, és eredetileg Kelet-Afrika erdeiből származik. A legénypálma csak néhány éve terjedt el nálunk is szobanövényként.

A legénypálma szokatlan növekedése első pillantásra a páfrányokra emlékeztet. A hajtásnak vélt formák azonban valójában levelek: úgynevezett szárnyas levelek borítják őket, míg a tulajdonképpeni hajtás, a gyöktörzs (rizóma) laposan kúszik végig a virágföldben. A legénypálma átlagos növekedési magassága 40–60 cm. Ha értő kezekbe kerül, akár egy méteresre is megnőhet. Virágok azonban ritkán nőnek a legénypálmán.





ELHELYEZÉS

- A világos, közvetetten benapozott hely ideális a számára
- A sötét sarkok sem jelentenek problémát – de kevés fény esetén a levelek egészen sötétzölddé válnak
- A 18 °C feletti normál szobahőmérséklet egész évben előnyös
- Vízáteresztő talaj a pangó víz elkerülése érdekében – pálmaföld vagy virágföldből és agyaggranulátumból álló keverék



ÖNTÖZÉS

- Tartsa a talajt mérsékelten szárazon, kerülje a pangó vizet
- Ritkán öntözze: Télen elegendő lehet 4 hetente öntözni
- 15 perccel öntözés után öntse le az alátétben maradt öntözővizet




GONDOZÁS

- A kisméretű növényeket évente egyszer zuhanyozza le gyenge vízszugárral, a nagyobbakat pedig portalanítsa nedves törölkendővel
- Áprilistól szeptemberig havonta egyszer trágyázza meg szobanövényekhez való, az öntözővízhez kevert műtrágyával
- A fiatal növényeket minden tavasszal ültesse át egy némileg nagyobb cserépbe
- A növényt akkor is át kell ültetni, ha pangó víz miatt rothadásnak indul a gyökér (ez a sárguló alsó levelekről ismerhető fel), hogy a rothadás ne támadja meg az egész növényt



SZAPORÍTÁS

- Szaporítás szétválasztással: Válassza ketté a növényt a gyökerénél, és ültesse át mindkét részt egy külön edénybe
- Szaporítás levéldugványokkal: Válassza le az egész levelet késsel a levéltengely alján, a szárnyas levelek alatt vágja le, tépkedje le az alsó szárnyas leveleket, és tegye a dugványt világos és meleg helyre egy vízzel teli pohárba, amíg gyökeret nem ereszt, majd ültesse be virágföldbe
- Szaporítás szárnyas levelekkel: tavasszal tépjén le egy lehetőleg nagyméretű szárnyas levelet egy jól fejlett levélborda középső vagy alsó részéről, körülbelül egyharmadát tegye szaporítóföldbe, majd tegye egy világos és meleg helyre, amíg a dugvány meg nem gyökerezik



3.13 ARANYPÁLMA

Dypsis lutescens

Az aranypálma eredetileg Madagaszkárról származik, de már mintegy 200 éve Európában is megtalálható. A pálmafélék családjába tartozik. Trópusi szobanövényként irodáknak is bevált díse. Az aranypálma keskeny, szorosan egymás mellett álló, csőszerű törzsekkel rendelkezik. Ezek egy laza, esernyő alakú fejben végződnek. A természetben a függőlegesen álló pálma akár 10 m magasra is megnő. A szobanövényként termesztett növények között a 3 méternél magasabb példányok már ritkák. A pálma – különösen az első években – meglehetősen lassan növekszik.





ELHELYEZÉS

- Nagyon sok fényt igényel, de a közvetlen napfényt nem szereti, különben a levelei megsárgulnak
- A magas páratartalom és a 20 °C körüli hőmérséklet ideális a számára
- A fiatal növényeknek télen is 18 °C feletti hőmérsékletre van szükségük
- Kerülje a huzatot és a hőmérséklet-ingadozást
- Használjon friss, tápanyagban és humuszban gazdag talajt



ÖNTÖZÉS

- Tartsa mindig nedvesen
- Használjon jó vízelvezetést biztosító cserepet és alátétet a pangó víz elkerülése érdekében
- Télen kevesebbet locsolja



GONDOZÁS

- Ha a helyiség levegője nagyon száraz, permetezze is be vízzel
- Tavasztól őszig minden héten trágyázzon virágokhoz való folyékony műtrágyával
- A fiatal növényt tavasszal ültesse át
- Az idősebb növényeket csak akkor ültesse át, ha a gyökerei már kitöltik az edényt
- Éles metszőollóval vágja le a sárga vagy elszáradt leveleket



SZAPORÍTÁS

- Az idősebb aranypálmákon gyakran tőhajtások alakulnak ki
- Válassza le a tőhajtásokat, és nevelje őket külön edényben
- A magvak az év bármely szakában kinyerhetők, ha a talaj hőmérséklete meghaladja a 25 °C-ot

3.14 RÁKVIRÁG

Aglaonema

A rákvirág eredetileg Indonéziában és a Fülöp-szigeteken nő. Az ezüstfehér éreztű levelekkel rendelkező növényt nálunk szobanövényként termesztik. A kontyvirágfélék tagjaként a rákvirág mérgező, ami azt jelenti, hogy a növény gondozása közben kesztyűt kell viselni. Sikeres beporzás után a rákvirág gyönyörű piros bogyókat hoz, ám ezekben csak gyönyörködni szabad, megkóstolni tilos!





ELHELYEZÉS

- Kevés fényre van szüksége
- Egész évben meleget és magas páratartalmat igényel
- A helyiség hőmérsékletét nyáron 20–25 °C-ra, télen pedig 18 °C-nál hidegebbre ne állítsa be
- Félárnyékos vagy árnyékos hely, például fürdőszoba vagy fűtött télikert
- Laza és jól vízáteresztő táptalaj
- Használjon jó minőségű, szerkezetileg stabil és humuszban gazdag, cserepes növényekhez való talajt



ÖNTÖZÉS

- A talajnak egyenletesen nedvesnek kell lennie, de soha nem lehet vizes
- Kizárólag szobahőmérsékletű, alacsony mésztartalmú vizet használjon
- Télen elég kevesebbet öntözni, mint nyáron



GONDOZÁS

- Rendszeresen permetezze be a nagyobb páratartalom érdekében (télen nem szükséges)
- Nagyjából kétfévente ültesse át
- A cserép inkább széles legyen, mint magas
- A jobb vízelvezetés érdekében helyezzen agyagdarabokat a cserép aljára



SZAPORÍTÁS

- Kiválóan szaporítható szétválasztással, lehetőleg az átültetés során
- Óvatosan válassza szét a gyökerbojtot úgy, hogy mindegyik résznek legalább három levele legyen, majd ültesse be az egyes részeket külön cserépbe
- A másik megoldás a bujtással való szaporítás lehet, ehhez tavasszal egyenként ültesse be a kis sarjhajtásokat
- A bujtásoknak jelentős talajhőre van szüksége, így ez a módszer valamivel nehezebben kivitelezhető



3.15 **VESSZŐKAKTUSZ**

Rhipsalis

A vesszőkaktusz egy trópusi kaktusz. Eredetileg a brazil trópusokról származik, azóta azonban komoly karriert futott be az európai lakásokban is. A vesszőkaktusz más kaktuszokhoz hasonlóan rendkívül robusztus. Hosszú, lecsüngő hajtásaival meglehetősen szokatlan növekedési formát mutat. Ez azonban egyúttal függő virágtartókban tárolható népszerű szobanövénné is teszi.





ELHELYEZÉS

- A világos és meleg helyiségeket szereti
- Kerülje a közvetlen napfényt
- Szobahőmérséklet kb. 20 °C-tól
- Túl világos környezet esetén a levelei vörösesen elszíneződnek
- Enyhén savas, vízáteresztő, elegendő nedvességet tárolni képes táptalajra van szüksége



ÖNTÖZÉS

- Rendszeresen kell öntözni
- A rövid száraz időszakok nem jelentenek problémát
- Kerülje a pangó vizet
- Hetente egyszer merítse szobahőmérsékletű vízbe, hogy a föld és a gyökerek megszívják magukat



GONDOZÁS

- Rendszeresen permetezze vízzel
- Márciustól szeptemberig kéthetente trágyázza meg szobanövényekhez vagy kaktuszokhoz való folyékony műtrágyával
- Két-három évente ültesse át friss táptalajba
- Ha az egyes hajtások túl hosszúak, vágja le őket éles ollóval



SZAPORÍTÁS

- Tavasszal vágjon le egy 10–15 cm hosszú dugványt, és hagyja száradni néhány napig
- A megszáradt dugványt helyezze néhány centiméter mélyre vízáteresztő szaporítóföldbe, és tartsa enyhén nedvesen

3.16 ZEBRALEVÉL

Calathea

A zebralevelet fészűvirágnak is nevezik, és a nyílgyökérfélék családjához tartozik. Az örökzöld évelő eredetileg Közép- és Dél-Amerikából, valamint a Nyugat-indiai-szigetokről származik. Hazájában egyes fajok virágait és gyökérgumóit fogyasztják. A levelek fajtól függően eltérő alakúak és színűek. Lehetnek tojás alakúak, kerekék vagy ellipszis alakúak, hosszú szárúak és fényesek. Színük a zöld különböző árnyalatait mutatja. Egyes fajok mintás vagy a lilától a rózsaszínig terjedő rajzolattal rendelkeznek. Különlegessége, hogy levelei éjszaka „alszanak”: Este összecsucskódnak, és csak reggel nyílnak ki újra. Ezt a mozgást a levelek alsó részén található csuklós kapcsolódás teszi lehetővé.





ELHELYEZÉS

- A legjobban olyan helyen fejlődik, ahol sok a fény, a közvetlen napfényt azonban kerülni kell
- Minél sötétebb a hely, annál kevesebb levélrajzolat látható
- Ügyeljen a magas páratartalomra, az újabb nemesítések a szárazabb levegőt is elviselik
- 20 °C és 25 °C közötti hőmérséklet szükséges, télen valamivel kevesebb
- A gyökereknél kerülni kell a huzatot és a hideget
- Jó vízelvezetésű és humuszban gazdag, de tápanyagban közepesen gazdag táptalajt használjon



ÖNTÖZÉS

- Langyos, alacsony mésztartalmú vízzel öntözze
- A táptalaj felszíne kissé kiszáradhat
- Inkább a több vizet kedveli



GONDOZÁS

- Közvetlenül a vásárlás után csomagolja újságpapírba a fagykárosodás megelőzése érdekében
- Vásárlás után abban az esetben ültesse át, amikor a cserép alján, a vízelvezető lyukon átbújnak a gyökerek, és a táptalaj már át van gyökeresedve
- Ha a helyiség levegője száraz, permetezze be a növényt alacsony mésztartalmú vízzel
- A növekedési időszakban kéthetente adagoljon műtrágyát az öntözővízhez
- Az elhalt leveleket ollóval vágja le



SZAPORÍTÁS

- Szaporítása tavasszal, átültetéskor lehetséges
- Óvatosan húzza szét a gyökérbojtot, közben ne sértse meg a gyökérzetet
- Helyezze a különálló részeket egy új cserépbe
- Másik megoldásként vágjon le legalább két levélpárral rendelkező hajtásdarabokat, dugja őket szaporítóföldbe, fedje le a cserepet átlátszó fóliával, és tegye meleg helyre



3.17 PÁLMALILIOM

Yucca

A jukka pálma (*Yucca gigantea*), amelyet helyesen óriás pálmaliliomnak hívnak, könnyen kezelhető jellege miatt rendkívül elterjedt. Valójában nem igazi pálmáról van szó, hanem a spárgafélék (*Asparagaceae*) családjába tartozik. Levélcsomója a pálmafákra emlékeztet, innen kapta a nevét. A növény eredetileg Mexikó és Közép-Amerika magaslatairól származik, ahol akár 2000 m magasságban is megterem. Az óriás pálmaliliom lassan növekszik, sok törődést nem igényel. Ezért kiváló szobanövény lehet kezdők és olyan emberek számára, akiknek nincs sok idejük a növények gondozására.





ELHELYEZÉS

- Világos, közvetlenül benapozott helyre is állítható
- Májustól októberig a szabadba, közvetlen napsütésre is helyezhető
- Szobanövényként egész évben a szellős helyeket kedveli
- Télen is tegye világos helyre
- Használjon vízáteresztő, szoba- vagy cserepes növényekhez való virágföldet
- Nagyon durva homokkal vagy agyaggranulátummal gondoskodjon a táptalaj fellazításáról



ÖNTÖZÉS

- Ritkán, de alaposan öntözze
- Tavasztól őszig, a növekedési szakaszban hetente egyszer öntözze, télen csak havonta egyszer
- Öntözés előtt ellenőrizze, hogy a talaj felső rétege jól kiszáradt-e
- Az alátétben vagy a kaspóban lévő felesleges vizet öntse le



GONDOZÁS

- Időnként permetezze be esővízzel vagy alacsony mésztartalmú csapvízzel
- Májustól szeptemberig kéthetente adagoljon szobanövényekhez való műtrágyát az öntözővízhez
- Két-három évente tavasszal ültesse át, ha azt szeretné, hogy a növény tovább növekedjen
- A gyorsan növekvő példányokat csak négy-öt évente ültesse át
- A hosszú hajtásokat tavasszal vágja vissza tiszta metszőollóval



SZAPORÍTÁS

- Szaporítás levágott levélcsomókkal: dugja őket a földbe, vagy gyökereztesse őket egy elsötétített, vízzel telt pohárba
- Szaporítás 12 cm hosszú, csupasz törzsdarabokkal: helyezze őket a földbe eredeti növekedési irányukban

3.18 **ALOKÁZIA**

Alocasia

Az alokázia olyan szobanövény, amely a szemlélőjét elsősorban gyönyörű mintázatú leveleivel nyűgözi le. Az alokázia eredetileg Délkelet-Ázsiából származik. A levelei különösen markáns látványt nyújtanak: A világosabb levélerek különösen jól mutatnak a gyakran sötétebb levélzölddel kontrasztban. Ezenkívül a levelek meglehetősen keskenyek és nyíl alakúak, a levelek alsó fele pedig lila vagy ibolyaszínű.





ELHELYEZÉS

- A világos és félárnyékos helyeket kedveli
- Általában az árnyékos elhelyezés sem jelent problémát
- Kerülje a közvetlen napfényt
- 18 °C feletti szobahőmérsékletet igényel
- Használjon humuszban gazdag, vízáteresztő táptalajt



ÖNTÖZÉS

- Tartsa a táptalajt egyenletesen nedvesen, és kerülje a pangó vizet
- Télen valamivel kevesebbet locsolja
- A táptalajt soha ne hagyja kiszáradni
- Szobahőmérsékletű, alacsony mésztartalmú vizet használjon



GONDOZÁS

- Száraz levegő esetén permetezze vízzel
- Áprilistól szeptemberig kéthetente trágyázza meg szobanövényekhez való, kis mennyiségű folyékony műtrágyával
- Nagyjából kétévente ültesse át friss táptalajba
- Rendszeres metszést nem igényel
- Az elhalt levél eltávolításakor vigyen fel némi faszénport a vágási felületre



SZAPORÍTÁS

- Szaporítás a gyökér szétválasztásával
- Átültetéskor éles késsel vágjon le egy darabot a gyöktörzsből
- Viseljen kesztyűt
- Kezdetben gondoskodjon arról, hogy az új növény kb. 25 °C-os hőmérsékleten tudjon fejlődni

3.19 LEPKEORCHIDEA

Phalaenopsis

A lepkeorchidea rendkívül robusztus és könnyen gondozható, ezért kedvelt szobanövény. Pillekosbornak is nevezik. Eredeti otthonát India, Indonézia és Észak-Ausztrália esőerdői jelentik. Az első nemesítések a 19. századból származnak. Színét tekintve a lepkeorchidea szemet gyönyörködtetően változatos: a tiszta hófehértől a rózsaszín, a sárga és a piros árnyalatokon keresztül egészen a liláig terjed, nem beszélve a többszínű, színátmenetes és foltos virágokról.





ELHELYEZÉS

- A világos, meleg helyeket kedveli
- Kerülje a közvetlen napfényt
- A magasabb páratartalom ideális a számára
- Használjon nagyon laza táptalajt, ideális esetben orchideaföldet



ÖNTÖZÉS

- Ne öntözze túl – nyáron hetente kétszer, a téli hónapokban hetente egyszer
- Állott, szobahőmérsékletű vízzel öntözze
- Kerülje a pangó vizet
- A növény gyökerét rendszeresen merítse szobahőmérsékletű vízbe, majd alaposan csepegtesse le



GONDOZÁS

- Rendszeresen permetezze vízzel
- Tavasztól őszig trágyázza némi orchidea-műtrágyával
- Virágzás után hagyja meg az összes virágkocsányt, mert azok tövéből fejlődnek ki a következő rügyek
- Az elszáradt virágzatot vágja vissza a zöld részig
- Kétévente ültesse át friss táptalajba
- Átültetés után 2–3 hétig ne öntözze, csak permetezze



3.20 **PÉNZLEVELŰ PILEA**

Pilea peperomioides

Kör alakú levelekkel rendelkezik és könnyen gondozható: Ez a pénzlevelű pilea rövid összefoglalása. Ez a szobanövény már jó ideje hódítja a lakásokat. Valójában a kínai Szecsuan és Jünnan tartományokból származik, és a csalánfélék családjába tartozik. Megfelelő gondozással 30–40 cm közötti méretűre nő meg. Virágot ritkán látni a pileán. Ha növelni szeretné ennek esélyét, érdemes a növényt télen hideg helyre tenni.





ELHELYEZÉS

- A világos, jól megvilágított, közvetlen napfénytől védett helyeket kedveli
- A közvetlen napfény a levelek megégéséhez vezet, túl sötét környezetben pedig a levelek elfakulnak és lehullanak
- A 15 °C és 18 °C közötti hűvös hőmérséklet az ideális, de normál szobahőmérsékleten is jól fejlődik
- Megfelelő táptalaj: Szobanövényekhez való virágföld, esetleg homokkal keverve, hogy a gyökereket védeni lehessen a pangó víztől



ÖNTÖZÉS

- Ha a virágföld legfelső rétege kissé már megszáradt, de az alatta lévő föld még nedves, öntözze meg a növényt
- Az öntözővíznek szobahőmérsékletűnek kell lennie, és azt nem szabad a levelekre locsolni
- Télen kevesebbet locsolja



GONDOZÁS

- Opcionális trágyázás szobanövényekhez való folyékony műtrágyával március és szeptember között kéthetente, télen 4–5 hetente
- Másik lehetőség: Hosszú hatástartamú műtrágya, például táprudak formájában
- A fiatal növényeket évente egyszer tavasszal ültesse át a növekedés elősegítése érdekében
- Az idősebb növényeket 3-4 évente elég átültetni
- Metszésre nincs szükség, de a túl hosszú hajtások tavasszal lerövidíthetők
- A tömör, sűrű növekedés érdekében időnként metssze meg a fiatal növényt



SZAPORÍTÁS

- Egyszerű szaporítás dugványokkal
- Akkor vágja le őket, amikor körülbelül 4 cm hosszúak, és már legalább öt levelük van
- Gyökereztesse őket egy pohár vízben, vagy ültesse őket közvetlenül nedves talajba



***További kérdések esetén
forduljon bizalommal üzleteinkben
dolgozó munkatársainkhoz!***